



آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو

عنوان سند:

دستورالعمل اخذ نمونه از غدد لنفاوی

شماره سند:

21-LA-WI-033-00

تاریخ	شماره بازنگری	شرح اقدام	تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
۱۳۹۳/۰۲/۱۰	00	تدوین کلی دستورالعمل	نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			احمد قاسمی	دکتر صابر اسمعیلی	دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی
			کارشناس آزمایشگاه	مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه	رئیس آزمایشگاه
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا
			نام و سمت	نام و سمت	نام و سمت
			امضا	امضا	امضا



آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو

شماره سند: 21-LA-WI-033

دستورالعمل اخذ نمونه از غدد لنفاوی

شماره بازنگری: 00

۱) هدف از ایجاد: هدف از ایجاد این دستورالعمل آشنایی کارکنان بخش نمونه گیری با نحوه صحیح پونکسیون از غدد لنفاوی در آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو می باشد.

۱-۱) بازنگری این سند بنا به پیشنهاد هر یک از کارکنان ذیصلاح و با تایید رئیس آزمایشگاه امکان پذیر می باشد.

۲) دامنه کاربرد: این دستورالعمل در آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو کاربرد داشته و کلیه کارکنان ملزم به رعایت آن هستند.

۳) منابع:

3-1) <http://www.webmd.com/cancer/lymph-node-biopsy>

3-2) <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003933.htm>

3.2) http://www.pennmedicine.org/encyclopedia/em_PrintArticle.aspx?gcid=003737

۴) تعاریف: -

۵) شرح اقدامات:

۱-۵) قبل از شروع به نمونه گیری وسایل لازم را آماده و کنترل کنید.

۱-۱-۵) توجه نمایید که نمونه برداری از غدد لنفاوی باید در شرایط کاملاً استریل و جراحی انجام گیرد. همچنین فرد

نمونه گیر باید دارای تخصص لازم در زمینه جراحی باشد.

۲-۵) فرد متقاضی را به محل نمونه گیری راهنمایی نمایید.

۳-۵) قبل از اقدام به نمونه گیری، از هویت مراجعه کننده با پرسیدن نام و نام خانوادگی اطمینان حاصل نمایید.

۴-۵) نمونه برداری با سوزن های مخصوص و در شرایطی کاملاً استریل صورت می گیرد.



آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو

شماره سند: 21-LA-WI-033

شماره بازنگری: 00

دستورالعمل اخذ نمونه از غده لنفاوی

۵-۵) قبل از انجام بیوپسی حتماً از شرایط بیمار مثل داروهای که مصرف می‌کند، حساسیت به ماده بی‌حسی، بیماری انعقادی خون و یا شرایط مشابه مطلع شوید.

۶-۵) ابتدا محل بیوپسی را ضدعفونی کنید.

۷-۵) بعد با سوزن معمولی و ماده بی‌حس‌کننده لیدوکائین پوست روی غده لنفاوی را بی‌حس کنید.

۸-۵) سپس با سوزن مخصوص به غده لنفاوی نفوذ کرده و بخشی از بافت را که در داخل سوزن باقی مانده، خارج کنید.

۹-۵) این کار باید خیلی سریع انجام شود (بین ۵ تا ۱۵ دقیقه) تا عارضه خاصی نداشته باشد.

۱۰-۵) بعد از انجام این کار با کمی فشار روی محل نمونه‌گیری و بانداژ جلوی خون‌ریزی گرفته شود.

۱-۱۰-۵) اگر نمونه برداری صحیح انجام نشود می‌تواند باعث گسترش عفونت در محل شود.

۲-۱۰-۵) قرمز و حساس شدن محل نمونه‌گیری، خارج شدن چرک، به وجود آمدن تب و تجمع مایع و کیست از محل نمونه‌گیری می‌تواند نشانه عوارض بیوپسی باشد که البته چندان معمول نیست.


۳-۱۰-۵) به بیمار توصیه نمایید تا در صورت بروز عوارض جانبی حتماً به پزشک مراجعه نمایید.

۱۰-۵) نمونه اخذ شده را در داخل فالكون های استریل حاوی سرم فیزیولوژی استریل بریزید و مشخصات نمونه، تاریخ و ساعت نمونه‌گیری، محل نمونه برداری و فرد نمونه‌گیر را بر روی آن ثبت نمایید.

۱۱-۵) نمونه را با حفظ زنجیره سرد به همراه لیست نمونه‌های پذیرش شده/ارجاع شده به شماره 21-LA-FO-004 سریعاً به آزمایشگاه انتقال دهید.

۱-۱۱-۵) در صورتی که امکان انتقال سریع نمونه به آزمایشگاه وجود نداشته باشد، نمونه را تا ۴۸ ساعت در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و سپس با حفظ زنجیره سرد نمونه را به آزمایشگاه انتقال دهید.

۲-۱۱-۵) در صورتی که انتقال نمونه به آزمایشگاه در طی ۴۸ ساعت امکان پذیر نباشد، نمونه را فریز نموده و تا زمان انتقال به آزمایشگاه در فریزر با دمای منهای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

شماره سند: 21-LA-WI-033	آزمایشگاه مرجع کشوری طاعون، تولارمی و تب کیو	
شماره بازنگری: 00	دستورالعمل اخذ نمونه از غدد لنفاوی	

۶) مستندات:

۶-۱) فرم لیست نمونه های پذیرش شده/ارجاع شده به شماره 21-LA-FO-004

